

和漢薬緩下剤《便秘薬》

快通養命丸

快通養命丸は、生薬（植物性成分）を配合した便秘薬です。
腸にやさしく作用し、自然でおだやかなお通じをもたらすお薬です。

⚠️使用上の注意

してはいけないこと ❌

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。】

- ①本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬（下剤）
- ②授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
- ③大量に服用しないでください。

相談すること



- ①次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (4) 次の症状のある人。《はげしい腹痛、吐き気・嘔吐》
- ②服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、吐き気・嘔吐

- ③服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。
下痢
- ④1週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください。

■ 効能又は効果

便秘。

便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振（食欲減退）、腹部膨満、腸内異常発酵、痔。

■ 用法及び用量

下記用量を1日2回朝夕の空腹時（又は食前30分あるいは食間）に服用してください。

		1回量	1日服用回数
大人（15才以上）	2～3日 便通がないとき	10～14粒	2回
	4日以上 便通がないとき	15～20粒	

ただし初回は最小量を用い、便通の具合や状態をみながら、少しずつ増量又は減量してください。

【用法・用量に関連する注意】

用法・用量を厳守してください。

■ 成分及び分量（40粒 1日量 3.2g中）

◎ダイオウ末……………1.40g

◎センナ末……………1.20g

添加物として、カンゾウ、ケイヒ、シヨウキョウ、炭酸カルシウム、
CMCカルシウム、アセンヤク、CMCナトリウム、サリチル酸を含有します。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しいところに密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かないところに保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4) 配置期限又は使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

お問合せ先

本剤のご使用により、何かお気付きの点がございましたら、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

養命製薬株式会社「お客様相談窓口」

TEL0766-53-1226 受付時間／9:00～16:00（土・日・祝日を除く）

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元 養命製薬株式会社

本社 〒939-0418 富山県射水市布目沢622-6
富山営業所 〒930-0853 富山県富山市永楽町7-10